

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «НИТА-ФАРМ»

Жуков О.И.

мая 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства Дезоклин® для дезинфекции объектов ветеринарного надзора
(организация-разработчик: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, г. Саратов,
ул. им. Осипова В.И., д. 1)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Дезоклин® (Disoclean).

2. Дезоклин® – комплексное дезинфицирующее средство в форме порошка.

Дезоклин® в 1 г содержит в качестве действующего вещества калия пероксомоносульфат (тройная соль) – 500 мг и вспомогательные вещества: поверхностно-активное вещество – додецилбензолсульфонат натрия, кислоты (яблочная и сульфаминовая), неорганические буферные системы (хлорид натрия, полифосфат натрия), краситель и отдушку цитрусовую.

3. Дезоклин® представляет собой порошок от светло-серого до розового цвета со слабым запахом лимона, легко растворимый в воде.

4. Выпускают дезинфицирующее средство Дезоклин® расфасованным по 50 и 500 г, по 1 и 2,5 кг в пакеты из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги; по 5 кг - в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым внутренним слоем.

На этикетке каждой упаковки указывают: наименование организации-производителя, ее адрес и товарный знак; название средства; название и содержание действующих веществ; номер партии (включает дату изготовления - день, месяц, год); срок годности; условия хранения; объем средства; надпись: «Для дезинфекции в ветеринарии»; назначение, способ применения, и снабжают инструкцией по применению средства.

Хранят дезинфицирующее средство Дезоклин® в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, воспламеняющихся веществ, сильных щелочей и кислот, при температуре от 0°C до +30°C.

Срок годности при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 5 лет со дня производства. После первого вскрытия первичной упаковки средство Дезоклин® хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте. После вскрытия упаковки Дезоклин® следует использовать в течение 28 дней.

Дезоклин® не должен применяться по истечении срока годности.

Транспортируют Дезоклин® всеми видами транспорта в таре организации-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Дезинфицирующее средство Дезоклин® обладает широким спектром антимикробного действия в отношении бактерий, вирусов (включая возбудителя африканской чумы свиней) и грибов. Действует как сильный окислитель. Органические кислоты в сочетании с неорганическим буфером создают кислую среду и оптимизируют дезинфицирующую активность калия пероксомоносульфата. В связи с этим Дезоклин® эффективен в жесткой воде, в присутствии органических загрязнений и при низких температурах окружающей среды.

Средство эффективно против патогенов I - IV групп устойчивости.

Растворы средства не обладают коррозионной активностью, не оказывают отрицательного влияния на материалы обрабатываемых поверхностей.

6. По степени воздействия на организм Дезоклин® относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Рабочие растворы средства Дезоклин® по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Безопасен для человека при использовании в соответствии с настоящей инструкцией.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Дезоклин® применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции (текущей и заключительной) объектов ветеринарного надзора:

- животноводческих, свиноводческих, звероводческих, птицеводческих помещений, в т.ч. инкубаториев, находящегося в них технологического оборудования и инвентаря;

- помещений кормоцехов, кормокухонь и других вспомогательных объектов животноводства, находящегося в них технологического оборудования и инвентаря;

- производственных помещений и технологического оборудования на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей промышленности, цехов по переработке продуктов убоя, помещений санитарных боен на мясокомбинатах и убойных пунктов, молочных блоков на молочно-товарных фермах и комплексах, яйцескладов, а также тары для хранения и перевозки кормов и продукции животного происхождения;

- автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов и других видов транспортных средств, используемых для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения;

- ветеринарных учреждений (лечебницы, клиники, лаборатории, виварии, питомники), находящегося в них оборудования, инвентаря, инструментов и лабораторной посуды;

- поверхностей в помещениях для содержания животных, клеток и инвентаря в питомниках по разведению собак и кошек, зоопарках, цирках;

- систем водоснабжения.

8. Дезинфекцию рабочими растворами Дезоклин® проводят в отсутствие животных и птицы влажным способом (орошение, протирание, погружение) или аэрозольно. Перед проведением дезинфекции проводят механическую очистку и мойку помещений и оборудования.

Для профилактической и вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии, возбудители которых относятся к 1 (малоустойчивые) и 2 (устойчивые) группам устойчивости к дезинфицирующим средствам, влажным или аэрозольным способом предварительно очищенных поверхностей и оборудования, а также в дезинфекционных барьерах и ковриках, используют 1% раствор Дезоклин®.

Вынужденную (текущую и заключительную) дезинфекцию при африканской чуме свиней проводят 3% раствором. Деконтаминацию шкур животных, невосприимчивых к африканской чуме свиней, при вывозе проводят 6% раствором.

Для термической аэрозольной дезинфекции (профилактической и вынужденной) животноводческих и вспомогательных помещений, инкубаторов, помещений для хранения и переработки продукции животного происхождения и кормов, убойных пунктов, используют 4% раствор Дезоклин®.

Для дезинфекции систем подачи воды для поения животных используют 0,5% рабочий раствор Дезоклин®.

9. Рабочие растворы применяют в соответствии со способами применения, указанными в таблице:

Режимы дезинфекции объектов растворами средства Дезоклин®

Цель применения	Способ обработки	Вид дезинфекции	Концентрация рабочих растворов	Способ применения
Дезинфекция животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений, их территорий и вспомогательных объектов, помещений ветеринарных клиник (станций), лабораторий, вивариив, цирков и зоопарков, производственных помещений и территории предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности, транспорта для перевозки животных и птицы, сырья и продукции животного происхождения	Мелкокапельное орошение Холодная аэрозольная дезинфекция	Профилактическая и вынужденная (текущая и заключительная)	1 %	Рабочий раствор наносят на предварительно очищенные поверхности с помощью распылителя с нормой расхода 300 мл/м ² и или другого распылителя с нормой расхода 300 мл/м ² и экспозицией 30-60 мин Рабочий раствор распыляют с помощью аэрозольного генератора холодного тумана в дозе 1 л/10 м ² пола при высоте помещения 3,5 м, что составляет 1 л/35 м ³ в течение 30 мин.
Дезинфекция животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений, их территорий и вспомогательных объектов, помещений ветеринарных клиник (станций), лабораторий, вивариив, цирков и зоопарков, производственных помещений и территории предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности, транспорта для перевозки животных и птицы, сырья и продукции животного происхождения при АЧС	Мелкокапельное орошение	Вынужденная (текущая и заключительная)	1 %	Аэрозольную дезинфекцию в помещениях проводят в течение 30-60 мин с помощью аэрозольного генератора горячего тумана в дозе 1 л/40 м ² пола при высоте помещения 3,5 м, что составляет 1 л/140 м ³
Дезинфекция систем полачи воды для поения животных и птиц	Заполнение резервуара для воды и системы полачи воды	Профилактическая и вынужденная (текущая и заключительная)	3 %	Рабочий раствор наносят на предварительно очищенные поверхности с помощью распылителя с нормой расхода 300 мл/м ² и экспозицией 1 час
Дезбарьеры и дезковрики для обуви, колпыт животных, колес транспортных средств	Контактная обработка	Профилактическая и вынужденная	1 %	Оборудование дезинфицируют рабочим раствором с помощью распылителя низкого давления или другого распылителя с нормой расхода 300 мл/м ² и экспозицией 15-60 мин, в зависимости от степени загрязнения. Затем ополаскивают чистой водой
Дезбарьеры и дезковрики для обуви, колпыт животных, колес транспортных средств при АЧС	Контактная обработка	Профилактическая и вынужденная	0,5 %	Рабочим раствором заполняют резервуар для воды и систему подачи воды с экспозицией 60 мин, затем раствор сливают, а резервуар и систему подачи воды тщательно промывают чистой водой
Деконтаминация шкур животных, невостриимичных к вирусу африканской чумы свиней, при вывозе из очага АЧС	Мелкокапельное орошение	Вынужденная	3 %	Рабочий раствор меняют каждые 4 дня или по мере загрязнения
			6 %	Шкуры животных орошают рабочим раствором двукратно с интервалом 30 мин при норме расхода 700 мл/м ² на каждое орошение с экспозицией 60 мин. По окончании установлении экспозиции шкуры ополаскивают чистой водой.

Количество средства Дезоклин[®], необходимое для приготовления рабочих растворов

Концентрация рабочего раствора, %	Объемы средства и воды	
	Дезоклин [®] , г	Вода, мл
0,5	5,0	995,0
1	10,0	990,0
3	30,0	970,0
4	40,0	960,0*
6	60,0	940,0

* - Для приготовления 4% рабочего раствора для термической аэрозольной дезинфекции предварительно смешивают стабилизатор аэрозоля (пропиленгликоль и др.) с водой из расчета 15 частей стабилизатора на 85 частей воды, затем в полученный раствор добавляют 4 части средства Дезоклин[®].

Аэрозольную дезинфекцию проводят при отключенной вентиляции и в плотно (герметично) закрытом помещении, в отсутствие животных и птицы.

По окончании аэрозольной дезинфекции помещения перед вводом животных проветривают в течение 30-60 мин.

Рабочие растворы средства Дезоклин[®] сохраняют свою активность в течение 4-7 суток.

Для применения рабочих растворов Дезоклин[®] при отрицательных температурах (до -18°C) рекомендуется готовить рабочий раствор Дезоклин[®] на основе 40% водного раствора пропиленгликоля. 1% раствор Дезоклин[®] с содержанием 40% пропиленгликоля хранят не более 4 суток при температуре до -18°C. 3% раствор Дезоклин[®] с содержанием 40% пропиленгликоля хранят не более 1 суток при температуре до -18°C.

Рабочие растворы прозрачные, светло-розового цвета. Светло-розовый цвет является индикатором дезинфицирующей активности Дезоклин[®]. При изменении внешнего вида раствора (появление хлопьев, изменение цвета на желтоватый) раствор не пригоден для применения, необходимо приготовить свежий раствор.

10. Допускается проведение локальной обработки отдельных свободных от животных станкомест в занятых животноводческих помещениях, отдельных единиц оборудования и участков поверхности на предприятиях при условии вентиляции помещений и отсутствия животных и людей без спецодежды в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

По окончании установленной экспозиции доступные для животных участки поверхностей, кормушки, поилки, другие места возможного скопления дезраствора, а также оборудование из коррозионнонестойких материалов ополаскивают водой для удаления остатков дезинфицирующего средства и помещение просушивают.

11. Отработанный рабочий раствор дезинфицирующего средства Дезоклин[®] разбавляют большим количеством воды и сливают в канализацию. При соблюдении рекомендаций по применению Дезоклин[®] не оказывает вредного воздействия на сооружения по очистке сточных вод.

12. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в действующих «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002 г). В качестве нейтрализатора используют стерильную воду.

IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

13. При использовании в соответствии с настоящей инструкцией дезинфицирующее средство Дезоклин[®] является безопасным для человека. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, кормящие и беременные женщины не допускаются к работе с дезинфицирующим средством и его растворами. Лицам с заболеваниями кожи и повышенной

чувствительностью к химическим веществам следует осуществлять работу со средством с осторожностью.

Все работы по приготовлению рабочих растворов и применению средства Дезоклин® следует осуществлять с использованием спецодежды (халат или комбинезон, резиновый фартук, резиновые сапоги, резиновые перчатки, герметичные защитные очки, респиратор РПГ-67; РУ-60 (с патроном марки А или Б) или противогаз).

Во время работы запрещается пить, принимать пищу и курить.

При приготовлении рабочих растворов средства Дезоклин® следует избегать попадания средства на кожу, в глаза и органы дыхания.

При рассыпании средства его необходимо смести с поверхности, место обильно смочить водой и тщательно вымыть.

14. При несоблюдении мер предосторожности при попадании средства в органы дыхания возможно острое токсическое воздействие средства, которое характеризуется кашлем, затрудненным дыханием, беспокойством. Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух и обратиться за медицинской помощью.

При попадании средства Дезоклин® или его растворов на кожу их необходимо смыть большим количеством проточной воды.

При попадании средства Дезоклин® или его растворов в глаза их следует немедленно промыть под струей воды в течение нескольких минут и обратиться за медицинской помощью.

При случайном проглатывании средства или его растворов рвоту не вызывать. Промыть рот большим количеством чистой воды. Дать пострадавшему выпить 3-5 стаканов воды, если пострадавший находится в сознании. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

15. Дезинфицирующее средство Дезоклин® следует хранить в местах, недоступных для детей.

16. Пустую тару из-под дезинфицирующего средства запрещается использовать для бытовых нужд. Складировать пустую тару из-под дезинфицирующего средства следует в специально отведенных местах, утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Наименование и адрес производственной площадки производителя дезинфицирующего средства для ветеринарного применения

ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов
ул. им. Осипова В.И., д.1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения дезинфицирующего средства на принятие претензий от потребителя.

ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов
ул. им. Осипова В.И., д.1.